



## AFINITOR

### Informativa per i pazienti sull'uso del farmaco

**PRINCIPIO ATTIVO:** everolimus

**FORMA FARMACEUTICA:** compresse

**MODO D'ASSUNZIONE:** Afinitor deve essere somministrato per via orale una volta al giorno alla stessa ora, regolarmente con o senza cibo. Le compresse di Afinitor vanno inghiottite intere con un bicchiere d'acqua e non devono essere masticate o frantumate.

In caso di vomito non assumere una dose aggiuntiva. Se si dimentica di assumere una dose, può prenderla entro 6 ore dall'orario prestabilito. Oltre le sei ore, salti la dose dimenticata e continui con il normale ritmo posologico.

In caso di vomito o se si dimentica di assumere Afinitor, non reintegri la dose ma continui con il normale ritmo posologico. Si raccomanda di non assumere mai due dosi contemporaneamente. Se ha dei dubbi, non esiti a contattare il suo medico.

Le compresse contengono lattosio quindi non sono adatte per i soggetti con deficit di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio.

**MANIPOLAZIONE:** Questo medicinale non deve essere manipolato da persone diverse dal paziente e dal personale sanitario, in particolare non da donne in gravidanza. Il personale sanitario deve indossare guanti monouso quando manipola le compresse, mentre il paziente deve lavarsi bene le mani dopo aver toccato il farmaco.

#### **INTERAZIONI:**

**CON FARMACI:** Durante il trattamento con Afinitor è sconsigliata l'assunzione dei seguenti farmaci:

- **ANTIBIOTICI:** RIFAMICINA e RIFAMPICINA riducono in modo significativo l'esposizione a everolimus con rischio di fallimento terapeutico, mentre ERITROMICINA e CLARITROMICINA aumentano la concentrazione del principio attivo nel sangue.
- **ANTIMICOTICI** (KETOCONAZOLO, POSACONAZOLO, VORICONAZOLO): possono aumentare la concentrazione di everolimus nel sangue.
- **IPERICO:** può ridurre in modo significativo l'esposizione a everolimus.
- **FENITOINA e CARBAMAZEPINA:** riducono significativamente l'esposizione a everolimus.
- **VERAPAMILA:** può ridurre l'esposizione a everolimus.

Inoltre Afinitor può influenzare la risposta immunitaria alle vaccinazioni e, quindi, le vaccinazioni effettuate durante la terapia possono essere meno efficaci. Chieda sempre consiglio al medico o al farmacista prima di effettuare una vaccinazione.

**CON CIBO:** evitare di mangiare il pompelmo o di berne il succo poiché possono aumentare l'esposizione a everolimus.

**CONSERVAZIONE:** Conservare a temperatura ambiente e nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.



## CAPECITABINA

### Informativa per i pazienti sull'uso del farmaco

**PRINCIPIO ATTIVO:** capecitabina

**FORMA FARMACEUTICA:** compresse rivestite

**MODO D'ASSUNZIONE:** Assuma il farmaco come le ha indicato il suo medico, rispettando attentamente la posologia.

Le compresse di Capecitabina Medac devono essere ingerite intere, con un bicchiere pieno d'acqua, entro 30 minuti dopo un pasto. Si raccomanda di non dividere, spezzare o masticare le compresse.

Se si dimentica di assumere una dose, la prenda appena se ne ricorda. Se ciò avviene a distanza ravvicinata dalla dose successiva non assumere la dose dimenticata e continuare con il normale ritmo posologico. Si raccomanda di non assumere mai due dosi contemporaneamente. In caso abbia dei dubbi, non esiti a contattare il suo medico.

Le compresse contengono lattosio quindi non sono adatte per i soggetti con deficit di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio.

**MANIPOLAZIONE:** Accertato che il rivestimento esterno della compressa è intatto, non ci sono rischi nel maneggiare Capecitabina Medac. In ogni caso si raccomanda alle donne in gravidanza di non manipolare questo medicinale. È opportuno lavarsi bene le mani dopo aver toccato il farmaco.

#### **INTERAZIONI:**

**CON FARMACI:** Durante il trattamento con Capecitabina Medac è sconsigliata l'assunzione dei seguenti farmaci:

- **WARFARIN e FENPROCUMONE:** possono aumentare il rischio di sanguinamento.
- **FENITOINA:** l'uso concomitante può aumentare la concentrazione di fenitoina nel sangue e quindi la sua tossicità.

Inoltre, alcuni tipi di vaccinazioni non sono raccomandate perché possono portare ad un aumentato rischio di infezione da parte del vaccino. Chieda sempre consiglio al medico o al farmacista prima di effettuare una vaccinazione.

**CON CIBO:** nessuna interazione

**CONSERVAZIONE:** Conservare a temperatura non superiore a 30 °C. Proteggere dalla luce e dall'umidità.