



## NAVELBINE

### Informativa per i pazienti sull'uso del farmaco

**PRINCIPIO ATTIVO:** vinorelbina bitartrato

**FORMA FARMACEUTICA:** capsule molli

**MODO D'ASSUNZIONE:** Le capsule di Navelbine vanno deglutite intere con un po' d'acqua e non devono essere masticate né succhiate. Si consiglia l'assunzione con un po' di cibo.

In caso di vomito entro poche ore dall'assunzione del farmaco, non ripetere mai la somministrazione di questa dose.

Se si dimentica di assumere una dose, la prenda appena se ne ricorda. Se ciò avviene a distanza ravvicinata dalla dose successiva non assumere la dose dimenticata e continuare con il normale ritmo posologico. Si raccomanda di non assumere mai due dosi contemporaneamente.

**MANIPOLAZIONE:** Se il paziente dovesse per errore masticare o succhiare la capsula, è necessario procedere ad un risciacquo della bocca con acqua o con una normale soluzione fisiologica.

Se la capsula risultasse tagliata o danneggiata: il liquido contenuto è irritante e pertanto potrebbe determinare lesioni in caso di contatto con la pelle o con le mucose o con gli occhi. Le capsule danneggiate non devono essere ingerite e devono essere riportate in farmacia; in caso di contatto, lavarsi immediatamente con acqua.

#### **INTERAZIONI:**

**CON FARMACI:** Durante il trattamento con Navelbine è sconsigliata l'assunzione dei seguenti farmaci:

**ITRACONAZOLO:** può aumentare la concentrazione di Navelbine nel sangue con conseguente aumento del rischio di tossicità.

**CLARITROMICINA:** può aumentare l'esposizione a Navelbine.

**GEFITINIB:** può ridurre il numero di globuli bianchi nel sangue.

**CISPLATINO:** può aumentare il rischio di tossicità al sangue.

Inoltre, alcuni tipi di vaccinazioni non sono raccomandate perché possono portare ad un aumentato rischio di infezione da parte del vaccino. Chieda sempre consiglio al medico o al farmacista prima di effettuare una vaccinazione.

**CON CIBO:** nessuna interazione.

**CONSERVAZIONE:** Conservare a 2 – 8 °C (in frigorifero), nell'imballo originale



## REVLIMID

### Informativa per i pazienti sull'uso del farmaco

**PRINCIPIO ATTIVO:** lenalidomide

**FORMA FARMACEUTICA:** capsule rigide

**MODO D'ASSUNZIONE:** La dose prescritta di Revlimid deve essere assunta una volta al giorno, preferibilmente sempre alla stessa ora.

Le capsule vanno deglutite intere con un bicchiere d'acqua, con o senza cibo, e non devono essere aperte o masticate.

Se si dimentica di assumere una dose, la prenda appena se ne ricorda. Se sono passate più di 12 ore dall'orario prestabilito, non assumere la dose dimenticata e continuare con il normale ritmo posologico. Si raccomanda di non assumere mai due dosi contemporaneamente. In caso abbia dei dubbi, non esiti a contattare il suo medico.

Le capsule contengono lattosio quindi non sono adatte per i soggetti con deficit di lattasi, intolleranza al galattosio o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio.

**MANIPOLAZIONE:** Questo medicinale non deve essere manipolato da persone diverse dal paziente e dal personale sanitario, in particolare non deve essere maneggiato da donne in gravidanza o in età fertile.

Se la capsula dovesse risultare aperta o rotta si raccomanda di non toccare il contenuto.

Se inavvertitamente si entrasse in contatto con la polvere della capsula, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

#### **INTERAZIONI:**

**CON FARMACI:** Durante il trattamento con Revlimid è sconsigliata l'assunzione dei seguenti farmaci:

- ITRACONAZOLO: può aumentare l'esposizione a lenalidomide.
- DIGOSSINA: l'uso concomitante può aumentare la concentrazione di diossina nel sangue.

**CON CIBO:** nessuna interazione.

**CONSERVAZIONE:** Conservare a temperatura ambiente e nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.