

	Nota informativa Intervento di Asportazione cisti Epididimo	ALL03_IOuroIT001_SIC	Pag 1 di
		Verifica Dr E Berselli RAQ	Rev 00
		Approvazione Dr V. Beatrici Direttore UOC Urologia	Del 22.01.19

Definizione

Le cisti dell'epididimo possono formarsi ovunque nell'epididimo ma sono più frequenti nella testa. Sono piuttosto comuni e la loro frequenza aumenta con l'età. Vengono identificate incidentalmente nel 70% degli uomini che si sottopongono ad ecografia scrotale.

Indicazioni

L'intervento chirurgico per una cisti dell'epididimo è raramente indicato. In genere le cisti sono asintomatiche e non ostruiscono il tubulo epididimario dal quale originano. L'asportazione può tuttavia causare ostruzione dell'epididimo.

L'asportazione delle cisti è indicata soltanto quando la cisti è causa di dolore intrattabile o quando assuma dimensioni cospicue.

Descrizione della tecnica

Il testicolo viene exteriorizzato attraverso un'incisione mediana sul rafe o un'incisione scrotale trasversa e la tunica vaginale viene aperta. La cisti viene isolata dall'epididimo onde evitare involontari danni ai tubuli epididimari. Il punto di connessione tra cisti ed epididimo viene legato per evitare la fuoriuscita di liquido. La vaginale viene suturata e dartos e cute vengono chiusi in due piani.

Quest'intervento può essere eseguito in anestesia locale e in ambiente di Day Surgery.

Complicanze

L'asportazione di cisti non dovrebbe essere effettuata su uomini in età riproduttiva poiché registra un'alta incidenza di occlusione del sistema duttale a seguito dell'intervento. Inoltre possono aversi anche dolore scrotale e recidiva a seguito dell'intervento.