

	Nota informativa L'INTERVENTO DI DISFUNZIONE ERETTILE (PROTESI PENIENA)	ALL06_IOuroIT001_SIC	Pag 1 di 1
		Verifica Dr E Berselli RAQ	Rev 00
		Approvazione Dr V. Beatrici Direttore UOC Urologia	Del 22.01.19

DEFINIZIONE

Per disfunzione erettile si intende l'incapacità ad ottenere e mantenere una erezione adeguata allo svolgimento di un soddisfacente rapporto sessuale.

DESCRIZIONE DELLA TECNICA

La terapia prevede l'utilizzo di farmaci a somministrazione orale (inibitori della 5-fosfodiesterasi PDE5-1) o intrauretrale, o iniettiva intra-cavernosa con prostaglandina E1 (PGE1) (alprostadil).

Un'alternativa è rappresentata dall'utilizzo dei vacuum device.

L'opzione chirurgica è rappresentata dall'impianto nei corpi cavernosi di una protesi peniena indicata in tutte le forme di disfunzione erettile che non rispondono ad altri presidi terapeutici o nei casi in cui i trattamenti farmacologici siano controindicati o abbiano determinato la comparsa di importanti effetti collaterali.

Le protesi possono essere rigide, semi-rigide o idrauliche.

L'intervento viene di solito eseguito in anestesia generale o periferica.

COMPLICANZE

Le complicanze possibili sono: l'infezione, ecchimosi, ematoma, edema, fibrosi, perdita di sensibilità, ritenzione urinaria, rottura o malfunzionamento della protesi, decubito, attivazione e disattivazione spontanea, dolore, erosione e necrosi.