

	NOTA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE DA SOTTOPORRE A TEST CUTANEI PER FARMACI	MOD04_IOalleT001_ORG	Pag. 1 di 1
		Verifica: Dr. E. Berselli RAQ	Rev 00
		Approvazione: Dr. F.M. Mei	Del 29/12/17

Paziente: _____

Dalle notizie anamnestiche che ci ha fornito, risulta che Lei ha presentato una reazione avversa in occasione di una precedente assunzione dei farmaci che di seguito ci segnala _____

- Sulla base di linee guida internazionali e nazionali, riteniamo utile sottoporLa ad un iter diagnostico per le reazioni avverse a farmaci, che prevede come primo step l'esecuzione di test cutanei con i seguenti metodici: prick-intradermoreazione-patch.
- In genere il prick rappresenta il primo approccio nella diagnostica cutanea, solo quando è negativo, viene integrato con una eventuale intradermoreazione o test di esposizione.
- Sulla base della reazione da Lei riferita riteniamo utile praticarLe _____.
- In caso di positività potrà avere una reazione cutanea localizzata, che in genere compare entro 15-30 minuti e regredisce in 1-2 ore. Occasionalmente la reazione può comparire a distanza di 24-48 ore o addirittura dopo un intervallo più lungo, rendendo opportuno effettuare anche una lettura ritardata.
- La metodica del patch test consiste nell'applicazione di cerotti contenenti i farmaci da testare, opportunamente diluiti e preparati. Tali cerotti vanno mantenuti in sede per 48-72 ore. Qualora dovesse presentare dei disturbi durante tale periodo dovrà segnalarceli.
- Il test può dare luogo a false positività, in questi casi dovremo intraprendere ulteriori procedure diagnostiche, che Le saranno di volta in volta specificate.
- L'esame viene eseguito in regime ambulatoriale e dovrà restare in osservazione per tutto il tempo necessario, in modo da assicurarLe un tempestivo intervento in caso di eventuali reazioni indesiderate.
- Questa procedura diagnostica in rari casi potrebbe provocare anche delle reazioni avverse a distanza dalla zona di applicazione, quali prurito, eritema, orticaria, angioedema, disturbi del respiro o altro. A seconda del farmaco utilizzato, è stata riscontrata un'incidenza che varia dallo 0,5% al 11%. Le possiamo assicurare che da parte nostra verranno messe in atto tutte le misure prudenziali necessarie per evitare o ridurre al minimo il rischio di tali evenienze e per fronteggiarle, qualora si dovessero verificare.
- Il test viene, generalmente, eseguito in fase di remissione, in assenza di sintomi da almeno 3-4 settimane.
- E' opportuno che da almeno una settimana sospenda l'eventuale uso di Antistaminici, Cortisonici

_____.

Data _____