

	Nota informativa TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DEL REFLUSSO VESCICO-URETERALE	ALL28_IOuroIT001_SIC	Pag 1 di
		Verifica Dr E Berselli RAQ	Rev 00
		Approvazione Dr V. Beatrici Direttore UOC Urologia	Del 29.01.19

DEFINIZIONE

Procedura endoscopica per via uretrale basata sull'iniezione sottomucosa peri-meatale di materiale eterologo al fine di evitare il reflusso di urina dalla vescica all'uretere e quindi al rene durante la minzione.

Indicazioni:

- Trattamento primario di reflussi vescico-ureterali di qualsiasi grado;
- Vescica neurologica ad alto rischio di reflusso;
- Reflusso persistente secondario a reimpianto ureterale sintomatico.

DEFINIZIONE DELLA TECNICA

Il trattamento endoscopico del reflusso vescico-ureterale avviene previa introduzione di uno strumento endoscopico (cistoscopio) in vescica attraverso l'uretra. Individuato il meato ureterale, viene introdotto attraverso il canale operativo dell'endoscopio uno speciale ago collegato con un sistema a siringa. Inserito l'ago nello strato sottomucoso peri-meatale si inietterà la sostanza che determinerà la formazione di un ponfo con funzione di valvola.

Attualmente vi sono in commercio diverse sostanze utilizzabili in tal senso, alcune di derivazione animale (collagene), altre sintetiche (Teflon). Altre ancora, sono costituite da micro-sfere iniettabili con lo stesso principio.

Preparazione all'intervento: preparazione analoga agli altri interventi per via endoscopica:

- Digiuno da mezzanotte (del giorno precedente l'intervento);
- Dieta priva di scorie ed eventuale clistere evacuativo;
- Tricotomia;
- Profilassi antibiotica;
- Profilassi antitrombotica nei pazienti a rischio;
- Test intradermico al collagene (per valutare la presenza di eventuali reazioni allergiche) nel caso si propenda per questa sostanza.

Durata dell'intervento: l'intervento prevede una durata variabile da 15 a 30 minuti.

Tipo e durata del ricovero: il ricovero può essere effettuato in regime di Day Hospital o ordinario.

COMPLICANZE

	Nota informativa TRATTAMENTO ENDOSCOPICO DEL REFLUSSO VESCICO-URETERALE	ALL28_IOuroIT001_SIC	Pag 1 di
		Verifica Dr E Berselli RAQ	Rev 00
		Approvazione Dr V. Beatrici Direttore UOC Urologia	Del 29.01.19

- Reazioni allergiche da ipersensibilità al prodotto;
- Occlusione del meato ureterale;
- Idronefrosi;
- Colica renale;
- Febbre.

Attenzione da porre alla dimissione: non esistono precauzioni particolari da segnalare.